

수리 영역

제 2 교시

자 연 계

성명

수험번호

- 먼저 수험생이 선택한 계열의 문제인지 확인하십시오.
- 문제지에 성명과 수험 번호를 정확히 기입하십시오.
- 답안지에 수험 번호, 응시 계열, 문형, 답을 표기할 때에는 반드시 '수험생이 지켜야 할 일'에 따라 표기하십시오.
- 주관 답의 숫자에 0이 포함된 경우, 0을 OMR 답안지에 반드시 표기해야 합니다.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오. 배점은 2점 또는 3점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

1. 유리방정식 $(\sqrt{x}-\sqrt{3})(\sqrt{x}+\sqrt{3})=4$ 의 근은? [2 점]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

2. 두 벡터 $\vec{a}=(2,-3.2)$, $\vec{b}=(1,-4.0)$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은? [2 점]

- ① $\frac{2}{17}$ ② $\frac{5}{17}$ ③ $\frac{8}{17}$ ④ $\frac{11}{17}$ ⑤ $\frac{14}{17}$

3. 복소수 z 가 $|z|=1$ 일 때, $\frac{z}{z+\frac{1}{z}}$ 의 값은? [2 점]

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ ⑤

4. 다음 식을 성립하게 하는 상수 a, b 의 곱의 값은? [2 점]

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+ax+b} = \frac{1}{3}$$

- ① -3 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

5. 방정식 $x^2 - y^2 + 2y + a = 0$ 이 나타내는 도형이 x 축에 평행인 주축을 갖는 쌍곡선이 되기 위한 a 의 값의 범위는? [2 점]

- ① $a < -1$ ② $a > -1$ ③ $a < 1$
 ④ $a > 1$ ⑤ $a > 2$

6. 함수 $f(x) = 2 \sin^3 x + \sin 2x \cos x + 2 \cos x$ 의 최대값은? [2 점]

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$ ④ 2 ⑤ $2\sqrt{2}$

7. (a, b, c) 를 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 위의 한 점의 좌표라고 할 때, 두 평면

$$ax + by + cz = 1$$

$$ax + by + cz = 3$$

사이의 최단거리는? [2 점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ ⑤

8. 세 자료

A : 1 부터 50 까지의 자연수

B : 51 부터 100 까지의 자연수

C : 1 부터 100 까지의 짝수

의 표준편차를 순서대로 a, b, c 라 할 때, 의 대소관계를 바르게 나타낸 것은? [3 점]

- ① $a = b = c$ ② $a = b < c$ ③ $a < b < c$
 ④ $a < b < c$ ⑤ $a < c < b$

수리영역

9. $1 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$\alpha x \leq e^x \leq \beta x$$

가 성립하도록 상수 α, β 를 정할 때, $\beta - \alpha$ 의 최소값은? [3 점]

- ① $\frac{e}{2}$ ② e ③ $e\left(\frac{e^3}{4} - 1\right)$
 ④ $e\left(\frac{e^2}{3} - 1\right)$ ⑤ $e\left(\frac{e}{2} - 1\right)$

10. 연립부등식 $x > 0$, $y + x \geq 0$, $y - 2x \leq 0$ 이 나타내는

좌표평면 위의 영역을 D 라 하자. D 에 속하는 두 점

$P(a, b)$, $Q(c, d)$ 에 대하여 $\frac{b+d}{a+c}$ 의 최대값과 최소값의 차는? [3 점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ 2
 ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

11. 지수함수의 그래프에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? [2 점]

—<보 기>—

ㄱ. $y=2^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동하면 $y=\frac{1}{2^x}$ 의 그래프가 된다.

ㄴ. $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 $y=2^x$ 의 그래프보다 아래에 놓이게 된다.

ㄷ. $y=\sqrt{2} \cdot 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 평행이동하여 $y=2^x$ 의 그래프를 얻을 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sqrt{17}-4 = \frac{1}{8+a_1} = \frac{1}{8+\frac{1}{8+a_2}} = \frac{1}{8+\frac{1}{8+\frac{1}{8+a_3}}} = \dots$$

을 만족시킬 때, a_{2002} 의 값은? [3 점]

- ① $\sqrt{17}-4$ ② $3-\sqrt{17}$ ③
 ④ $\sqrt{17}$ ⑤ $\sqrt{17}+4$

4 자연계

수리영역

13. 어떤 종류의 연산회로는 행렬들로 나타낼 수 있다. 이 연산회로의 입력과 출력은 행렬 $a = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 로, 연산자 $\boxed{U}$ 는 2차 정사각행렬 U 로 표현된다. 기본 연산회로 $a \rightarrow \boxed{U}$ 는 U_a 를 수행하고 $a \rightarrow \boxed{U} \Rightarrow \boxed{V}$ 는 VU_a 의 행렬연산을 수행한다. 다음은 연산자 $\boxed{X}$, $\boxed{Y}$, $\boxed{Z}$ 에 대응되는 행렬이다.

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Z = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

입력 $a = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 를 연산회로

$$a \rightarrow \boxed{Z} \Rightarrow (\text{가}) \Rightarrow \boxed{X}$$

에서 수행한 결과가 $\frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 일 때, 다음 중 (가)에 알맞은 것은? [3점]

- ① $\boxed{Z} \Rightarrow \boxed{X}$ ② $\boxed{Z} \Rightarrow \boxed{Y}$ ③ $\boxed{X} \Rightarrow \boxed{X}$
 ④ $\boxed{Y} \Rightarrow \boxed{Y}$ ⑤ $\boxed{Y} \Rightarrow \boxed{X}$

14. 한 평면에 서로 다른 n 개의 직선을 그려서 나누어진 영역의 수의 최소값을 $f(n)$, 최대값을 $g(n)$ 이라 하자. <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? [3점]

- <보 기>—
 ㄱ. $f(2)=3$, $g(2)=4$ 이다.
 ㄴ. 모든 n 에 대하여 $f(n)=n+1$ 이다.
 ㄷ. 모든 n 에 대하여 $g(n) \leq f(n+1)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음을 만족하는 다항함수에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? [3점]

$$f_0(x) = 1$$

$$f_1(x) = x$$

$$f_{n+1}(x) = xf_n(x) + f_{n-1}(x) \quad (n \text{은 자연수})$$

- <보 기>—
 ㄱ. $f_{2n-1}(0)=0$, $f_{2n}(0)=1$ 이다.
 ㄴ. $f_{2n-1}(x)$ 는 기함수이고, $f_{2n}(x)$ 는 우함수이다.
 ㄷ. $f_{2n-1}(x)$ 와 $f_{2n}(x)$ 의 항의 개수는 각각 개이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


16. 함수 $f(x) = [x[x]]$ 에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.) [3점]

- <보 기>—
 ㄱ. $f(x) = -1$ 이 되는 x 는 존재하지 않는다.
 ㄴ. 자연수 n 에 대해서 집합 $\{f(x) \mid n \leq x < n+1\}$ 의 원소의 개수는 n 개다.
 ㄷ. 자연수 n 에 대해서 집합 $\{f(x) \mid -n \leq x < -n+1\}$ 의 원소의 개수는 $n+1$ 개이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

수리영역

17. 다음은 정삼각형 ABC의 변 BC 위의 한 점 D를 잡아 직선 AD가 △ABC의 외접원과 만나는 점을 E라 할 때,



$$\frac{1}{DE} = \frac{1}{EB} + \frac{1}{CE}$$

임을 보인 것이다.

〈증명〉

선분 CE의 연장선 위에 $\overline{EB} = \overline{EP}$ 인 점 P를 잡는다. 네 점 A, B, E, C는 한 원 위에 있으므로

$$\angle AEC = \angle ABC = 60^\circ \text{ 이고}$$

$$\angle AEB = \angle ACB = 60^\circ \text{ 이다.}$$

따라서 $\square(\text{가}) = 60^\circ$ 이고 $\overline{EB} = \overline{EP}$ 이므로

△EBP는 정삼각형이다.

$$\text{그러므로 } \square(\text{나}) = 60^\circ = \angle DEC \text{ 이고}$$

선분 BP와 DE는 평행하다. △CBP와 △CDE는 닮음이므로

$$\overline{BP} : \overline{DE} = \overline{CP} : \square(\text{다}) \text{ 이고}$$

$$\overline{BP} \cdot \square(\text{다}) = \overline{DE} \cdot \overline{CP} \text{ 이다. 또한}$$

$$\overline{BP} = \overline{EP} = \overline{EB}, \overline{CP} = \overline{CE} + \overline{EP} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \overline{EB} \cdot \square(\text{다}) &= \overline{DE}(\overline{CE} + \overline{EP}) \\ &= \overline{DE}(\overline{CE} + \overline{EB}) \end{aligned}$$

가 된다. 양변을 $\overline{EB} \cdot \overline{CE} \cdot \overline{DE}$ 로 나누면

$$\frac{1}{DE} = \frac{1}{EB} + \frac{1}{CE} \text{ 이다.}$$

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? [3점]

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|------|------|-----------------|
| ① | ∠PEB | ∠BPE | $\overline{CE}$ |
| ② | ∠PEB | ∠BPE | $\overline{CD}$ |
| ③ | ∠EBP | ∠CBE | $\overline{CE}$ |
| ④ | ∠PEB | ∠DCE | $\overline{CD}$ |
| ⑤ | ∠PEB | ∠BED | $\overline{CD}$ |

18. 다음은 자연수 m, n 에 대해서 $m^4 + 4^n$ 이 소수이고 또는 $n \neq 1$ 이면, m 은 홀수이고 n 은 짝수임을 증명한 것이다.

〈증명〉

m 이 짝수이거나 n 이 홀수라 가정하자.

(i) m 이 짝수이면 $m = 2j$ 꼴의 정수이고,

$$m^4 + 4^n = 4 \cdot (4j^4 + 4^{n-1}) \text{ 이므로}$$

이것은 가정에 모순이므로 m 은 홀수이다.

(ii) n 이 홀수이면 $n = 2k - 1$ 꼴의 정수이다.

$$m^4 + 4^n = m^4 + 4^{2k-1} \text{ 은 다음과 같이 인수분해 된다.}$$

$$m^4 + 4^{2k-1} = (\square(\text{나})) (m^2 + m \cdot 2^k + 2 \cdot 4^{k-1})$$

이 수는 소수이므로 $\square(\text{나}) = 1$ 또는

$$(m^2 + m \cdot 2^k + 2 \cdot 4^{k-1}) = 1 \text{ 이다.}$$

그런데, $(m^2 + m \cdot 2^k + 2 \cdot 4^{k-1}) > 1$ 이므로 $\square(\text{나}) = 1$ 이다.

$$\square(\text{나}) = (\square(\text{다}))^2 + 4^{k-1} = 1 \text{로부터}$$

$$k = 1, m = 1 \text{ 이다. 따라서, } m = 1, n = 1 \text{ 이다.}$$

이것은 가정에 모순이므로 n 은 짝수이다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? [3점]

- | | (가) | (나) | (다) |
|-----------|-----|--|-----|
| ① 소수가 아니다 | | $m^2 - m \cdot 2^k + 2 \cdot 4^{k-1}$ | |
| ② 소수이다 | | $m^2 - m \cdot 2^k + 2 \cdot 4^{k-1}$ | |
| ③ 소수가 아니다 | | $m^2 - m \cdot 2^{k+1} + 5 \cdot 4^{k-1}$ | |
| ④ 소수이다 | | $m^2 - m \cdot 2^{k+1} + 5 \cdot 4^{k-1}$ | |
| ⑤ 소수가 아니다 | | $m^2 - m \cdot 2^{k+2} + 17 \cdot 4^{k-1}$ | |

6 자연계

수리영역


19. 두 함수 $f(x) = ax + b$ 와 $g(x) = e^x$ 가

$$f(g(x)) = \int_0^x f(t)g(t)dt - x e^x + 3$$

을 만족할 때, $f(2)$ 의 값은? [3 점]

- ① 4 ② 2 ③ 0 ④ -2 ⑤ -4

20. 그림과 같이 좌표평면 위에 원과 반원으로 이루어진 태극문양이 있다. 태극문양과 직선 $y = a(x-1)$ 이 서로 다른 다섯 점에서 만나게 되는 a 의 범위는? [3 점]




- ① $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $0 < a < \frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $0 < a < \frac{2}{3}$
 ④ $0 < a < \frac{\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $0 < a < \frac{\sqrt{6}}{3}$

21. 함수 $f(x) = x^2 - x - 6$, $g(x) = x^2 - ax + 4$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $(f \circ g)(x) \geq 0$ 이 되는 실수 a 의 범위는? (단, f 는 g 와 f 의 합성함수이다.) [3 점]

- ① $a \leq -1, a \geq 1$ ② $-1 \leq a \leq 1$ ③
 ④ $-2 \leq a \leq 2$ ⑤ $-4 \leq a \leq 4$


22. 어떤 물질은 원자를 구로 나타낼 경우 똑같은 구들을 규칙적으로 배열하여 얻은 정육각형 격자구조를 갖는다. 아래 그림은 이 격자구조의 한 단면에 놓여 있는 원자의 중심을 연결한 것이다. 이 구조에서 한 원자의 에너지는 인접한 원자의 수와 거리에 영향을 받는다. 가장 인접한 원자의 중심간의 거리가 모두 1일 때, 동일 평면상에서 고정된 한 원자와 중심사이의 거리가 2인 원자의 개수는? [3 점]



- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 12 ⑤ 16

수리영역

23. 직선거리가 500m 인 A 지점과 B 지점을 연결하는 도로를 건설하려고 했지만, 경사도가 37° 여서 우회도로가 필요하였다. 그래서 그림과 같이 12° 의 경사도를 유지하는 도로를 건설하기로 결정하였다. A 지점에서 B 지점까지 이 우회도로의 거리는 약 몇 m 인가? (단, $\sin 12^\circ = 0.2$, $\sin 37^\circ = 0.6$ 으로 계산한다.) [3 점]



- ① 800 m ② 1000 m ③ 1200 m
④ 1500 m ⑤ 1800 m

24. 중심도시에서 상품을 구매하는 주변도시의 전체 구매량은 다음과 같은 법칙을 따른다고 하자.
- “각 주변도시 B, C 의 시민들이 중심도시 A 시에서 상품을 구매할 때, 각 도시의 전체 구매량은 그 도시의 인구수에 비례하고 A 시와의 거리의 제곱에 반비례한다.”
- 위 법칙과 아래 표에 의거하여 신도시 C시를 건설하려고 한다.

구분 도시	인 구 (단위 : 명)	A시로부터의 거리 (단위 : km)
B 시	500000	20
C 시	x	10

- A 시에서 구매하는 C 시의 전체의 구매량이 B 시의 전체 구매량의 절반이 되게 하려면 C 시의 인구 x 를 얼마로 예상해야 하는가? [3 점]

- ① 42500 ② 52500 ③ 62500
④ 72500 ⑤ 82500

주관식 문항 (25 ~ 30)

25. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $\frac{1}{2002} \sum_{n=1}^{2002} A^n = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 일 때, $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오. [3 점]

26. 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+4} + 2x}{x^{2n} + 1}$ 일 때, 의 값을 구하시오. [2 점]

8 자연계

수리영역

27. $U=\{1,2,3,4,5\}$ 일 때, $\{2,3\}\cap A\neq\emptyset$ 를 만족시키는 U 의 부분집합 A 의 개수를 구하시오. [3 점]

28. 다음 방정식의 모든 해의 곱을 구하시오. [2 점]
 $(\log_2 x)^3 + \log_2 x^3 = 4(\log_2 x)^2 + \log_2 x$

29. 어떤 행사에서 20 종류의 스티커를 모으면 경품을 받을 수 있다고 한다. 갑은 네 종류, 을과 병은 각각 다섯 종류의 스티커를 모았다. 두 사람씩 비교하였을 때 각각 세 종류의 스티커가 공통으로 있었고, 세 사람을 함께 비교하였을 때는 두 종류의 스티커가 공통으로 있었다. 갑, 을, 병의 스티커를 모아서 경품을 받으려고 할 때, 최소로 더 필요한 스티커의 종류의 수를 구하시오. [3 점]

30. 어떤 상품의 가격은 매달 0.5의 확률로 10% 상승하거나 0.5의 확률로 10% 하락한다. 이 상품의 현재가격은 500 원이다. 두 달 후, 이 상품의 가격이 500 원 이하이면 500 원에서 두 달 후 상품가격을 뺀 금액을 받고, 500 원 이상이면 받지 않기로 하였다. 두 달 후 받을 수 있는 금액의 기대값을 소수점 아래 둘째 자리까지 구하시오. (단, 첫 번째 달의 가격변동과 두 번째 달의 가격변동은 서로 독립이다.) [3 점]

